

Localización	Intensidad.	Irradiación
Hemicráneo	Muy intenso	Orbitaria
Hemicránea	Muy intensa	Orbitaria
Hemicránea	Intensa	
Fronto-orbitaria.	Muy intensa.	órbita y nasal
Holocránea	Progresiva	Occipucio
Hemicara	En crisis Intolerable. Con intervalos libres.	Frente, mejilla y mandíbula
Fosa amigdaliana Dorso lingual.	En crisis.	Posterior de la lengua.
Occipital.	Muy intenso	2/3 posteriores del cráneo.
Cefalea frontal	Intensa	No tiene.
Precordial.	Intenso.	Hombro izqdo. Brazo y meñique y anular

izquierdos.

Precordial	Moderado	Hombro y base del cuello
------------	----------	--------------------------

Precordial.	Muy intenso.	Interescapular. A veces hacia las piernas.
-------------	--------------	--

Tórax	Moderado.	No se irradia.
-------	-----------	----------------

Epigástrico	Moderado.	A zona lumbar alta.
-------------	-----------	---------------------

Epigástrico	Intenso	A hipocondrio derecho y dorso ipsilateral.
-------------	---------	---

Epigástrico	Muy intenso.	A hipocondrio izquierdo y zona lumbar alta.
-------------	--------------	--

Epigástrico	Moderado	Foso ilíaca derecha.
-------------	----------	----------------------

Epigástrico y periumbilical.	Moderado.	Fosa ilíaca izquierda.
------------------------------	-----------	------------------------

Lumbar	Intenso.	Flanco y fosa ilíaca ipsilateral, labios mayores en la mujer y escroto en el hombre, y en zona anterior del muslo.
--------	----------	--

Lumbar	Intenso.	A glúteo, zona posterior de muslo, pierna y primer orto
--------	----------	--

Lumbar.	Intenso.	A glúteo, zona posterior de muslo, pierna, tres últimos ortejos.
---------	----------	--

Fosa ilíaca.	Intenso	Hombro ipsilateral A veces epigastralgia.
Epigástrico y periumbilical.	Moderado.	Hacia región sacra.
Inguinal	Severo	Hacia región glútea.
Mano.	Moderado.	Palma y tres primeros dedos y a veces al antebrazo.
Muslo (lateral)	Moderado.	Región lateral del muslo.
Pantorrilla	Moderado	Al talón.

CARACTERIZACIÓN de DOLORES en MEDICINA.

Carácter.	C. Agravante.	C. Atenuante.
Pulsátil	Luz, ayuno, alcohol, ruido , movimiento.	Oscuridad
Sorda o pulsátil con escotomas y, a veces, ceguera.	Movimiento	Vasoconstrictores.
Se acompaña de parestesias faciales o linguales, hemiplegia transitoria.	Movimiento, ruido.	Analgésicos
Pulsátil, con epífora unilateral y sensación de obstrucción nasal ipsilateral.	Ayuno, luz,	Aspirar O2.
Sordo, pulsátil	Maniobra de Valsalva Decúbito dorsal.	Corticoides
Urente,	Frío, masticación	Carbamazepina-Amitriptilina.
Urente	Deglución.	Carbamazepina-Amitriptilina
Sordo	Apoyo de la cabeza en la almohada.	Pregabalina.
Sordo.	Decúbito dorsal	Antibióticos.
Opresivo	Ejercicio, calor, emoción, comidas.	Nitritos.

Opresivo y en puntada.	Torsión del tronco.	Posición en P plrharia maho- metana.
Opresivo y desgarrante. Asimetría de pulsos.	Ejercicio. Emoción.	Cirugía aórtica.
Puntada de costado	Respiración profunda.	Analgésicos.
Urente	Ayuno, aspirina, Alcohol.	Comida, antiácidos.
Cólico.	Comidas grasas.	Antiespasmódicos.
Terebrante	Comida. Alcohol.	Posición en plegaria mahometana.
Sordo.Intermitente.	Comida.	Inclinado hacia delante.
Cólico o sordo.	Comida.	No tiene
Paroxístico. Cólico o sordo.	Erjercicio.	Antiespasmódicos.
croto en el ona anterior		
Sordo. Intenso. primer ortejo.	Cambios de posición.	Corticoides.
Sordo intenso.	Cambios de posición.	Corticoides.

Sordo.	Historia de amenorrea reciente en mujer joven.	Cirugía.
Sordo.	En la mitad del ciclo sexual de la mujer.	Cirugía
Sordo o puntada.	Con la abducción y aducción de la pierna.	Kinesiterapia.
Urente. al antebrazo.	Flexión de la muñeca.	Corticoides.
A veces urente.	Flexión del tronco.	Corticoides
Calambre.	Ejercicio.	Vasodilatadores.

Ritmo.	Período.	Estructura afectada.
Matinal.	no tiene	Migraña,
No tiene	No tiene	Migraña oftálmica.
No tiene	No tiene	Migraña con aura.
Nocturna	No tiene	Enfermedad de Horton.
Nocturno	No tiene	Tumor cerebral. Hipertensión intra craneana.
No tiene.	No tiene.	Neuralgia del Trigémino.
No tiene.	No tiene.	Neuralgia glossofaríngea
Matinal.	No tiene.	Neuralgia del occipital o Neuralgia de Arnold.
Matinal que cede hacia la tarde.	No tiene.	Sinusitis.
Post prandial.	No tiene,	Angina de pecho.

No tiene.	No tiene.	Pericarditis aguda.
No tiene.	No tiene.	Aneurisma disecante de la aorta.
No tiene.	No tiene.	Neumonía. Pleuresía. Atelectasia.
Post prandial tardío.	Primavera.	Úlcera gastroduodenal.
Post prandial tardío.	No tiene.	Cólico biliar.
Post prandial precoz.	No tiene.	Pancreatitis aguda.
No tiene.	No tiene	Apendicitis aguda.
No tiene.	No tiene	Diverticulitis aguda.
No tiene.	No tiene.	Cólico nefrítico.
No tiene	No tiene.	Hernia meniscal L4-L5
No tiene	No tiene	Hernia meniscal L5-S1.

No tiene.	No tiene.	Embarazo tubario
No tiene	No tiene	Hemorragia por ovulación. (Mittelshmerz)
No tiene.	No tiene.	Pinzamiento acetabular.
Nocturno.	No tiene	Síndrome del túnel carpiano
No tiene	No tiene.	Meralgia parestésica.
No tiene.	No tiene	Claudicación Intermitente.